

ЭПИЛЕПСИЯ В СИСТЕМЕ КОГНИТИВНЫХ НЕЙРОНАУК EPILEPSY IN THE SYSTEM OF COGNITIVE NEUROSCIENCES

Токарева Н.Г.

Россия, г. Саранск

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»

Медицинский институт

кафедра нервных болезней и психиатрии

tokareva-1@mail.ru

Tokareva N.G.

Russia, Saransk

National Research Mordovia State University N.P. Ogarev

Medical Institute

Department of Nervous Diseases and Psychiatry



Эпилепсия является распространенным заболеванием, занимающим ведущее место в системе когнитивных нейронаук. Данное заболевание затрагивает и, в той или иной степени, изменяет познавательную сферу психики больного, эмоционально-волевые процессы, отражается на всех сферах жизнедеятельности больных.

***Целью** данной работы было изучение особенностей эмоциональной сферы у больных эпилепсией. В данном исследовании изучалось взаимодействие психологических и клинических характеристик у больных эпилепсией, их роль в системе когнитивных нейронаук.*

***Материалы и методы.** В исследование было включено 317 больных в возрасте от 18 до 65 лет, с парциальными формами эпилепсии, в структуре болезни которых преобладали простые, сложные парциальные приступы, с длительностью заболевания до 30 лет. В исследовании приняли участие пациенты без выраженных нарушений когнитивных функций. Верификация диагноза у обследованных больных осуществлялась на основе результатов клиничко-неврологического, психопатологического, нейропсихологического, электро-энцефалографического обследования и данных компьютерной томографии головного мозга. В исследовании использована психодиагностическая методика - шкала тревоги Цунга (Tsung Alarm Scale), Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программы Statistica 10.0., значимыми считались различия при уровне $p < 0,05$.*

***Результаты.** Значительное место в структуре психопатологических расстройств у больных эпилепсией занимает аффект тревоги. В группу больных с данным нарушением вошли больные с тревожно - фобическими расстройствами (72,5%), паническим расстройством (23,5%), генерализованным тревожным расстройством (4%). По данным шкалы тревоги Цунга у больных эпилепсией были выявлены следующие закономерности: у большинства работающих больных эпилепсией тревога отсутствовала - 59.5% больных, либо отмечалась легкая степень тревоги - 35.4% больных, умеренная тревога выявлена у 12.5% больных. У неработающих больных эпилепсией преобладала умеренная тревога - 87.5%, у 64.6% больных выявлена легкая степень тревоги. Таким образом, среди работающих больных больше пациентов без повышенной тревоги, а среди неработающих больных больше пациентов с умеренной и легкой степенью тревоги. Полученные данные свидетельствуют о том, что восприятие болезни у больных эпилепсией связано с двумя переменными, которые поддаются психосоциальным вмешательствам: страх и беспокойство по поводу эпилепсии и потребность в информации и поддержке.*

***Выводы.** Полученные данные отражают особенности эмоциональных проявлений в структуре социально-психологической адаптации личности больных эпилепсией, которые характеризуют отношение больного к своей болезни с учетом таких переменных как трудовая занятость – трудовая незанятость, а также особенности взаимодействия в континууме больной - болезнь-социум.*

Работа поддержана РФФИ (грант № 20-013-00529)